


Formale Systeme

Prof. Dr. Bernhard Beckert, WS 2017/2018

Aussagenlogik: Syntax und Semantik

KIT – INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK





1918 – 2016, Berkley University

Craig's Lemma: 1950er Jahre, für Prädikatenlogik formuliert
Praktische Relevanz um Jahrtausendwende

Seien A, B aussagenlogische Formeln mit

$$\models A \rightarrow B$$

dann (und genau dann) gibt es eine Formel C mit

$$\models A \rightarrow C \quad \text{und} \quad \models C \rightarrow B,$$

so dass in C nur solche aussagenlogischen Atome $P \in \Sigma$ vorkommen, die sowohl in A als auch in B vorkommen.

Das Craigsche Interpolationslemma

Einfaches Beispiel

- ▶ $P_1 \wedge P_2 \rightarrow P_1 \vee P_3$ ist eine Tautologie.
- ▶ Ebenso $P_1 \wedge P_2 \rightarrow P_1$.
- ▶ Ebenso $P_1 \rightarrow P_1 \vee P_3$.
- ▶ Also: P_1 ist eine Interpolante für $P_1 \wedge P_2 \rightarrow P_1 \vee P_3$.

Seien P_1, \dots, P_n alle in A vorkommenden aussagenlogischen Atome, die nicht in B vorkommen.

Für Konstanten $c_i \in \{1, 0\}$ bezeichnen wir mit $A[c_1, \dots, c_n]$ die Formeln, die aus A hervorgeht, indem P_i durch c_i ersetzt wird für alle $1 \leq i \leq n$.

Wir setzen

$$C \equiv \bigvee_{(c_1, \dots, c_n) \in \{1, 0\}^n} A[c_1, \dots, c_n]$$

Beweis der Korrektheit der Konstruktion: Siehe Skriptum

Einfaches Beispiel zur Konstruktion von C

- ▶ Betrachte die Tautologie $A \rightarrow B$
mit $A = P_1 \wedge P_2$, $B = P_1 \vee P_3$.
- ▶ P_2 ist das einzige Atom, das in A , aber nicht in B
vorkommt.
- ▶ $A[1] = P_1 \wedge \mathbf{1} \equiv P_1$
- ▶ $A[0] = P_1 \wedge \mathbf{0} \equiv \mathbf{0}$
- ▶ $C = A[1] \vee A[0]$
 $\equiv P_1 \vee \mathbf{0}$
 $\equiv P_1$

Weiteres Beispiel zur Konstruktion von C

- ▶ $A \rightarrow B$ mit

$$A = (P_1 \vee \neg P_2) \wedge (\neg P_1 \vee \neg P_3) \wedge P_2$$

$$B = \neg((\neg P_2 \vee P_3) \wedge (P_2 \vee P_4) \wedge \neg P_4)$$
- ▶ $A \equiv P_1 \wedge P_2 \wedge \neg P_3$ und $B \equiv \neg P_2 \vee \neg P_3 \vee P_4$
- ▶ $A \rightarrow B$ ist eine Tautologie.
- ▶ P_1 ist einziges Atom in A und nicht in B .
- ▶ $A[1] = (1 \vee \neg P_2) \wedge (\neg 1 \vee \neg P_3) \wedge P_2$

$$\equiv 1 \wedge \neg P_3 \wedge P_2$$

$$\equiv \neg P_3 \wedge P_2$$
- ▶ $A[0] = (0 \vee \neg P_2) \wedge (\neg 0 \vee \neg P_3) \wedge P_2$

$$\equiv \neg P_2 \wedge 1 \wedge P_2$$

$$\equiv 0$$
- ▶ Also $C = (\neg P_3 \wedge P_2) \vee 0 \equiv \neg P_3 \wedge P_2$
ist eine Interpolante für $A \rightarrow B$.