


# Grundbegriffe der Informatik

## Musterlösung zu Aufgabenblatt 10

### Aufgabe 10.1 (3+3+1 Punkte)


- a) Geben Sie einen endlichen Akzeptor  $A = (Z, z_0, X, f, F)$  an, für den gilt:  
 $L(A) = \{a^n b^m \mid n \bmod 2 = m \bmod 3\}$ .

Idee: In die Zustände wird die Anzahl der  $a \bmod 2$  sowie die Anzahl der  $b \bmod 3$  gespeichert. Weiter wird darauf geachtet, dass nach einem  $b$  kein  $a$  kommen darf.




Hinweis: Die Paare  $00'$  und  $11$ ,  $01$  und  $12$  sowie  $10'$  und  $02$  kann man auch jeweils zu einem einzigen Zustand zusammenfassen.

- b) Geben Sie einen endlichen Akzeptor  $A = (Z, z_0, X, f, F)$  an, für den gilt:  
 $L(A) = \{w \in \{a, b\}^* \mid N_a(w) \bmod 2 = N_b(w) \bmod 3\}$ .



- c) Geben Sie für den folgenden Akzeptor  $A$  die Sprache  $L(A)$  an:




Die Sprache ist  $\{a\}^* \{b\}^* = \langle a * b^* \rangle = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}$ .

**Aufgabe 10.2 (2+2+3 Punkte)**


Gegeben sei folgender Moore-Automat  $M = (Z, z_0, X, f, Y, g)$ :  $Z = \{0, 1, 2\}$ ,  $z_0 = 0$ ,  $X = \{0, 1\}$ ,  $Y = \{a, b\}$

$\forall x \in X : f(0, x) = x, f(1, x) = 1 + x, f(2, x) = 1 - x$   
 $g(0) = \epsilon, g(1) = a, g(2) = b$ .

a) Stellen Sie  $M$  graphisch dar.



b) Geben Sie einen Mealy-Automaten  $M' = (Z', z'_0, X, f', Y', \bar{g})$  an, so dass gilt:  
 $\forall w \in X^* : g^{**}(0, w) = \bar{g}^{**}(z'_0, w)$ .



c) Beweisen Sie, dass für Ihren Mealy-Automaten  $M'$  gilt:  
 $\forall w \in X^* : g^{**}(0, w) = \bar{g}^{**}(z'_0, w)$ .

Es gilt für  $M' = (Z', z'_0, X, f', Y', \bar{g})$ :

$Z' = Z, z'_0 = 0, f' = f$  und  $\forall z \in Z \forall x \in X : \bar{g}(z, x) = g(f(z, x))$ .

Wir zeigen  $\forall w \in X^* : g^{**}(0, w) = \bar{g}^{**}(0, w)$  durch Induktion:

**Induktionsanfang:**  $w = \epsilon: g^{**}(0, \epsilon) = \epsilon = \bar{g}^{**}(0, \epsilon) \checkmark$

**Induktionsvoraussetzung:** Für ein festes, aber beliebiges  $w \in X^*$  gilt  $g^{**}(0, w) = \bar{g}^{**}(0, w)$ .

**Induktionsschluss:** Sei  $x \in X$  beliebig. Wir zeigen:

$g^{**}(0, wx) = \bar{g}^{**}(0, wx)$ .

$$\begin{aligned} \bar{g}^{**}(0, wx) &= \bar{g}^{**}(0, w)\bar{g}(f^*(0, w), x) \\ &\stackrel{IV}{=} g^{**}(0, w)\bar{g}(f^*(0, w), x) \stackrel{Def}{=} g^{**}(0, w)g(f(f^*(0, w), x)) = g^{**}(0, w)g(f^*(0, wx)) = \\ &g^{**}(0, wx), \end{aligned}$$

wie zu zeigen war.

Damit ist die Behauptung gezeigt.

### Aufgabe 10.3 (2+3+2 Punkte)

Gegeben seien zwei Mealy-Automaten  $M_1 = (Z_1, z_{01}, X, f_1, Y_1, g_1)$  und  $M_2 = (Z_2, z_{02}, X, f_2, Y_2, g_2)$  mit  $\forall i \in \mathbb{G}_2 \forall z \in Z_i \forall x \in X : |g_i(z, x)| = 1$ .

Der Endliche Akzeptor  $A = (Z, z_0, X, f, F)$  sei definiert durch:

$$Z = (Z_1 \times Z_2) \cup \{J\}, z_0 = (z_{01}, z_{02}), F = Z_1 \times Z_2$$

$$\forall (z_1, z_2) \in Z_1 \times Z_2 \forall x \in X : f((z_1, z_2), x) = \begin{cases} (f_1(z_1, x), f_2(z_2, x)) & \text{falls } g_1(z_1, x) = g_2(z_2, x) \\ J & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$\forall x \in X : f(J, x) = J.$$

a) Was ist  $f^*((z_{01}, z_{02}), w)$ , wenn  $w \in L(A)$  gilt?

$$\text{Für } w \in L(A) \text{ gilt } f^*((z_{01}, z_{02}), w) = (f_1^*(z_{01}, w), f_2^*(z_{02}, w)).$$

b) Beweisen Sie, dass Ihre Behauptung aus Teilaufgabe a) für alle  $w \in L(A)$  gilt.

$$\text{Induktionsanfang: } w = \epsilon : f^*((z_{01}, z_{02}), \epsilon) = (z_{01}, z_{02}) = (f_1^*(z_{01}, \epsilon), f_2^*(z_{02}, \epsilon)).$$

✓

**Induktionsvoraussetzung:** Für ein festes, aber beliebiges  $w \in X^*$  gilt:  $f^*((z_{01}, z_{02}), w) = (f_1^*(z_{01}, w), f_2^*(z_{02}, w))$  oder  $w \notin L(A)$ .

**Induktionsschluss:** Sei  $x \in X$  beliebig. Wir zeigen:

$$f^*((z_{01}, z_{02}), wx) = (f_1^*(z_{01}, wx), f_2^*(z_{02}, wx)) \text{ oder } wx \notin L(A).$$

Falls  $w \notin L(A)$  gilt, folgt  $f^*((z_{01}, z_{02}), w) = J$  und damit  $f^*((z_{01}, z_{02}), wx) = f(f^*((z_{01}, z_{02}), w), x) = f(J, x) = J$ , und es folgt  $wx \notin L(A)$ .

Falls  $w \in L(A)$  gilt, folgt nach Induktionsvoraussetzung  $f^*((z_{01}, z_{02}), w) = (f_1^*(z_{01}, w), f_2^*(z_{02}, w))$ ,

und damit  $f^*((z_{01}, z_{02}), wx) = f(f^*((z_{01}, z_{02}), w), x) = f((f_1^*(z_{01}, w), f_2^*(z_{02}, w)), x)$

$$= \begin{cases} (f_1(f_1^*(z_{01}, w), x), f_2(f_2^*(z_{02}, w), x)) & \text{falls } g_1(f_1^*(z_{01}, w), x) = g_2(f_2^*(z_{02}, w), x) \\ J & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (f_1^*(z_{01}, wx), f_2^*(z_{02}, wx)) & \text{falls } g_1(f_1^*(z_{01}, w), x) = g_2(f_2^*(z_{02}, w), x) \\ J & \text{sonst.} \end{cases}$$

Falls also  $wx \in L(A)$  gilt, und somit  $f^*((z_{01}, z_{02}), wx) \neq J$  gilt, folgt  $f^*((z_{01}, z_{02}), wx) = (f_1^*(z_{01}, wx), f_2^*(z_{02}, wx))$ , wie zu zeigen war.

Damit ist die Behauptung bewiesen.

c) Geben Sie eine mathematische Beschreibung von  $L(A)$  an.

$$L(A) = \{w \in X^* \mid g_1^*(z_{01}, w) = g_2^*(z_{02}, w)\}$$